

CRITERIOS DE PRIORIDAD CLINICA EN ECOENDOSCOPIA

CATEGORIA	INDICACIONES
<p style="text-align: center;">1 (1-30 días)</p>	<p>Alta probabilidad de patología orgánica significativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudio de LOE sólida pancreática • Confirmación histológica de neoplasia de páncreas no metastásica • Estudio de estenosis biliar sugestiva de malignidad sin enfermedad a distancia • Sospecha de ampuloma • Ictericia obstructiva sin causa aparente en pruebas de imagen • Estudio de extensión neoplasias digestivas • Adenopatías en contexto enfermedad neoplásica conocida • Lesiones sólidas mediastínicas o abdominales no abordables por vía percutánea • Terapéutica guiada por USE: <ul style="list-style-type: none"> Drenaje de colecciones Drenaje de vía biliar
<p style="text-align: center;">2 (30-90 días)</p>	<p>Probabilidad media de patología orgánica significativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudio de lesión quística pancreática > 15 mm • Adenopatías de naturaleza incierta • Dilatación de la vía biliar asociada a alteración analítica • Lesión submucosa en el contexto de antecedente de neoplasia • Sospecha de coledocolitiasis • Pancreatitis crónica con deterioro clínico • Estudio de pliegues gástricos engrosados
<p style="text-align: center;">3 (3-12 meses)</p>	<p>Baja probabilidad de patología orgánica significativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de lesión submucosa > 15 mm • Dilatación de la vía biliar y/o pancreática en ausencia de alteración analítica • Estudio de pancreatitis idiopático o recurrente • Sospecha / seguimiento de pancreatitis crónica • Seguimiento de lesiones quísticas pancreáticas • Screening de cáncer de páncreas • Dolor abdominal de probable origen biliar o pancreático • Evaluación de HTP